




NEUES ÜBER DIE TUMORZELLE- WISSEN WIR MEHR?

Dr. Ivonne Nel

Forschungslabor der
Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde
Klinikdirektorin: Prof. Dr. B. Aktas

Breast cancer pathogenesis and histologic vs. molecular subtypes

Eric Wong and Jenna Rebelo



Histological subtypes	Ductal	Lobular	Molecular subtypes	Triple negative ER-, PR-, HER2-			
				Triple negative	HER2+	Luminal B	Luminal A
Preinvasive cancer 25% Cells limited to basement membrane	Ductal carcinoma in situ (DCIS) 80% May spread through ducts and distort duct architecture 1% progress to invasive cancer per year Usually unilateral	Lobular carcinoma in situ (LCIS) 20% Does not distort duct architecture Same genetic abnormality as ILC - E-cadherin loss 1% progress per year Can be bilateral	% of breast cancers	15-20%	10-15%	20%	40%
Invasive cancer 75% Extension beyond the basement membrane	Invasive ductal carcinoma (IDC) 79% Usually from DCIS precursor Cause fibrous response, producing a palpable mass on examination Metastasis through lymphatics and blood	Invasive lobular carcinoma (ILC) 10% Usually from LCIS precursor Minimal fibrous response, presents less often with palpable mass Metastasis through abdominal viscera to GI, ovaries, uterus Almost always ER+	Receptor expression		HER2		ER+/PR+
			Histologic grade Level of cell differentiation	High (grade III)			Low (grade I)
			Prognosis Correlates to histologic grade	Poor			Good
			Response to medical therapy	Chemotherapy	Trastuzumab		Endocrine

Curr Treat Options Oncol. 2000 Aug;1(3):199-209.
Clin Transl Oncol. 2008 Dec;10(12):777-85.



Nat Clin Pract Oncol. 2007 Sep;4(9):516-25.
Robbins BE

Triple negative tumours respond best to chemotherapy, similar to other aggressive cancers.

Luminal A tumours respond best to endocrine therapy, e.g. antiestrogen or aromatase inhibitor.

Proliferation

Neoadjuv.-system.
Lokal-OP/Radio




???

HER2 low – ein neuer Subtyp?


DESTINY-Breast04: First Randomized Phase 3 Study of T-DXd vs Treatment of Physicians Choice for HER2-low MBC

- HER2-low (IHC 1+ vs IHC 2+/ISH+), unresectable, and/or MBC treated with 1-2 prior lines of chemotherapy in the metastatic setting
- HR+ disease considered endocrine refractory^a



This presentation is the intellectual property of the author/presenter. Contact her at sara.tolaney@dfci.harvard.edu for permission to reprint and/or distribute.

Trastuzumab deruxtecan (T-DXd)



Giuseppe Curigliano, MD PhD



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Sara M. Tolaney



Dana-Farber Cancer Institute

PRO

CONTRA

Klinisch-pathologische Eigenschaften

weniger Grade 3, niedrigere Proliferation

weniger Grade 3, niedrigere Proliferation
mehr HR+, ER expression nicht HER2 low Status

Prognose

besseres Überleben (OS;PFS), insb. HR+, bei non pCR

nur marginale Unterschiede bzgl. Überleben, HR Status entscheidend

bei ILC: schlechteres DFS vergl. Zu HER2 neg.

HER2 low vs. HER20: OS ähnlich; weniger pCR

Therapie

spezielle Therapie-Optionen

Wirkung T-DXd nach HR Status: kein Unterschied ORR, PFS,OS

DESTINY-Breast 04

Eigene Tumorbilogie

weniger TP53 Mutationen

Unterscheidung Subtypen durch HR Expression getrieben

bei TNBC erhöhte AR Expression
Wechsel zw. ER und HER2 Signaling möglich, somit Anpassung an Therapie-induzierten Stress (Resistenzen)

HER2 low durch HR Status (Anstieg mit ER)
geringere Proliferation in HR+; keine genetischen Unterschiede: ähnlich HR+ od. TNBC

instabil: Primarius vs. Metastase.

Fazit

HER2 low als **klinische**, aber nicht biologische, Entität

HER2 low als **Biomarker** für HER2 gerichtete Antikörper-Wirkstoff-Konjugate

Ausblick

Klinische Studien; T-DX in mBC mit **HER2 0: "ultra low"**

Ultra Low, nicht negativ! Sensitive Methoden für höhere Übereinstimmung

Dynamics of HER2-low expression in triple-negative breast cancer

Ana C. Garrido-Castro^{1,2,3}, Lan D. Ngo¹, E. Thomas Richardson^{1,3,4}, Jorge Gomez Tejeda Zanutto², John Navarro², Allison Frangieh¹, Ayesha Mohammed-Abreu¹, Melissa Hughes¹, Paolo Tarantino¹, Elizabeth A. Mittendorf^{1,3,4}, Sara M. Tolaney^{1,3}, Tari A. King^{1,3,4}, Eric P. Winer⁵, Nancy U. Lin^{1,3}, Nikhil Wagle^{1,2,3}

¹Breast Oncology Program, Dana-Farber/Brigham and Women's Cancer Center, Boston, MA; ²Broad Institute of MIT and Harvard, Cambridge, MA; ³Harvard Medical School, Boston, MA; ⁴Brigham and Women's Hospital, Boston, MA; ⁵Yale Cancer Center, New Haven, CT.

Figure 1. HER2 IHC from primary (DX) to metastatic (M) tumors (ALL groups).

TNBC: definiert als

ER/PR <10 %; HER2 IHC 0 oder low

110 Patienten:

eTNBC stage I-III, OP, n=20

eTNBC mit NACT; n=79


De novo stage IV mTNBC; n=11

HER2 IHC bei

Diagnose (DX),

RD (post-NACT),

Relapse (M)



n=53
Diskordanz:
49.1 %

HER20 -> low bei 15.4% (4/26) Zugewinn
HER2 low -> 0 bei 63% (17/27) Verlust

CTC-basierte Wahl der Erstlinien-Therapie bei HR+ HER- mBC

Therapieoption zwischen **CT vs. ET** :

ET bevorzugt (wenig Nebenwirkungen)

CT bei ungünstiger Prognose

-> Heterogene Entscheidungen

CTC Zahl (CellSearch®)

Standardisierter Liquid Biopsy Biomarker (FDA)

≥5 CTC/7.5ml Faktor für ungünstige Prognose
in jeder Therapie Linie (LoE I); schlechtes Überleben.

STIC CTC Konzept:

CTC Status als Hilfe zur Therapie-Entscheidung (ET vs CT) in
HR+ HER2- mBC

Einschlusskriterien:

Pre/post menopausale Frauen

HR+ (>10%) HER2- mBC

VOR Randomisierung:

➤ Wahl des Prüfers:

ET „Clin_{low}“ od. CT „Clin^{high}“

➤ CTC Zahl (CellSearch®)



Standard arm

Investigators' choice:

- Endoc.T. (Clin_{low})
- ChemoT. (Clin^{high})

CTC arm

Treatment driven by CTC count

- Endoc.T. if CTC_{low} (<5 CTC/7.5mL)
- ChemoT. if CTC^{high} (≥5 CTC/7.5mL)

n=755 Patienten

Feb. 2012 – Juli 2016; 17 Zentren in Frankreich

Primärer Endpunkt: PFS

Nicht unterlegen (15,5 vs. 13,9 Monate CTC vs. Klin.)

(Bidard F.C. et al JAMA Oncol 2021)

Finale Analyse:

Follow up bis 2021; Median 57 Monate

n= 664 PFS events (87,9%)

OS: n= 382 events (50,6%)


Subgruppen-Analyse PFS & OS

ET: AI oder Fulvestrant


CDK4/6i waren noch nicht zugelassen;

bei 42,2% in ≥2. Linie (beide Arme)

CT: Paclitaxel od. Capecitabin




60% Konkordanz zw. Klin. vs. CTC; gleiche Behandlung




40% Diskordanz zw. Klin. vs. CTC, unterschiedliche Behandlung

Pre-specified subgroup analysis: Clin_{low}/CTC^{high} (25.0% of patients)



Statistisch signifikanter
Überlebensvorteil im
CTC Arm (16 Monate)

Pre-specified subgroup analysis: Clin^{high}/CTC_{low} (13.6% of patients)



Kein Vorteil der CT

Erste prospektive Studie mit **hoher Evidenz** für klinischen Nutzen der CTC Detektion in HR+ HER2-mBC

Prim. Endpunkt erreicht: **PFS** nicht schlechter.

Langzeit Follow-Up:

Clin_{low}/CTC^{high} patients (25.0%)
Major OS benefit with chemotherapy
 $\Delta mOS = 16$ months

Clin^{high}/CTC_{low} patients (13.6%)
Chemotherapy not beneficial
Endocrine Therapy remains standard of care

Limitationen:

1. Linie ohne CDK4/6i


- Dilemma zw. ET und CT auch bei Patienten mit CDK4/6i als adjuvante od. 1. Linien-Therapie
 - Keine Phenotypisierung der CTCs (ER; HER2, etc)
 - Keine serielle CTC Bestimmung; nur vor Randomisierung
-
- **CTC Bestimmung VOR der Therapie als standardisierter Biomarker**, um Patienten mit aggressiven Tumoren zu selektieren

HER2 low:

Klinische Entität bzw.
Biomarker; standardisierte
sensitive Methoden
notwendig

CTCs:

STIC Trial,
Benefit bei $\text{Clin}_{\text{Low}}/\text{CTC}_{\text{high}}$
mit CT
aber nicht bei $\text{Clin}_{\text{high}}/\text{CTC}_{\text{Low}}$



DTCs:

Dormanz durch ECM
induzierbar (COL III)

ctDNA:

NGS bei mBC; für early BC
Tests nicht sensitiv genug,
Pipeline: Fragmentomics







Vielen Dank!

J. Javier Bravo-Cordero, PhD, Associate Professor

Dormanz, Extrazelluläre Matrix (Tumorzellen und Stroma) – osteogene Nische



Wie bleiben DTCs dormant? Können Tumorzellen ihre ECM regulieren?

Matrisom




COL III und Dormanz

Kann COL III in Tumorzellen Dormanz programmieren?



recurrence at 40 days	%
empty sponge	80
Col III sponge	20



Di Martino et al., *Nature Cancer* (2021)