

Rundschreiben Nr.: 04/2015

#### Elispot Diphtherie

Im Elispot kann die zelluläre Immunität gegenüber zahlreichen Antigenen reproduzierbar bestimmt werden. Wir bieten den Elispot im Rahmen der Immundefekt-Diagnostik für zahlreiche Antigene an, außerdem als IGRA (interferon-gamma release assay) zum Nachweis einer bestehenden Immunreaktion gegenüber *M. tuberculosis*. Die Bestimmung Interferon-gamma produzierender T-Zellen nach Stimulation mit Diphtherie-Antigen im Elispot entfällt ab sofort aus dem Anforderungsprofil der Klinischen Immunologie.

#### Änderungen im I-Soft Anforderungsschein

Bitte fordern Sie unsere Untersuchungen im Intranet über iSoft (Immunologie) an. Hinter der Mehrzahl der Untersuchungen sind Texthinweise zur Anforderung hinterlegt worden (gelb unterlegtes Kästchen): rechter Mausklick auf die Untersuchung.

#### Leistungsverzeichnis

Das aktuelle Leistungsverzeichnis (LV) des Institutes für Klinische Immunologie ist als Link dem iSoft Anforderungsschein angefügt worden (zweite Spalte von rechts, oben).

#### Allergie: Basophilenaktivierung

Der Basophilenaktivierungstest erlaubt eine Diagnostik von Allergien bei diskrepanten Befunden zwischen Hauttest, spezifischem IgE und Klinik bzw. bei allergischen Reaktionen ohne verfügbaren IgE-Test. Ab Mitte Mai sind stehen im Anforderungsprofil die folgenden Antigene zusätzlich zur Verfügung:

- Lidocain
- Mepivacain
- Diclofenac
- Paracetamol
- Ibuprofen

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung (Tel.: 25504).

Leipzig, 20. April 2015, Prof. Dr. med. Ulrich Sack